



ДИРЕКТНА РЕСТАВРАЦИЈА НА ФРАКТУРИРАНИ МАКСИЛАРНИ ЦЕНТРАЛНИ ИНЦИЗИВИ

Автор: Верица Тонева
Коавтор: Даниела Чуркоска

Ментор: Проф. д-р. Ивона Ковачевска,
асс. д-р. Катерина Фотева

ВОВЕД

Максиларните централни перманентни инцизиви се најизложени заби на трауматски повреди особено кај адолесцентите.

Најчесто настануваат фрактури на коронката со или без експозиција на пулпата.

Повредите сами по себе можат да остават значајни негативни функционални, естетски и психолошки последици кај индивидуата затоа треба правилно и навремено да се лекуваат и реставрираат со стремеж да се добие естетска реставрација која истовремено ќе задоволува и функционално.



ЦЕЛ

Естетска санација на фрактура на инцизалната третина на максиларен централен траен инцизив, со зафаќање на емајл и дентин, без експонирање на пулпата.

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

Пациент на возраст од 13 години дојден заради фрактура на максиларен централен десен инцизив како последица на пад од велосипед.

Забот е интактен, без кариес и други патолошки промени.

По извршениот преглед е утврдена фрактура на инцизалната третина на коронката, вклучувајќи емајл и дентин без експонирање на пулпата.

Забот беше со сочуван виталитет и немаше други трауматски повреди.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД



Слика 1: Клинички приказ на фрактура на максиларен перманентен централен инцизив.



Слика 2: Надокнадување на емајлот, лингвално со емајлова боја.



Слика 3: Реставрирање на дентин со дентинска боја.



Слика 4: Директна реставрација на фрактурирана коронка со нанокомпонентен материјал 3M ESPE's FILTEK Supreme Ultra.



Слика 5: Моделирање на анатомски-морфолошки карактеристики на забот.



Слика 6: Завршно полирање до висок сјај на забот.



Слика 7: Финално добиена естетска инцизална третина на максиларен перманентен централен инцизив.

РЕЗУЛТАТИ

Бенефити:

- широката палета на нијанси, со комбинација на дентински, емајлови и трансплуцентни нијанси обезбеди:

1.

- високо естетска реставрација со инцизална трансплуценција и природен изглед на коронката.

2.

- истовремено овозможуваме повторно воспоставување на функциите, кои претходно беа нарушени.

ЗАКЛУЧОК

При реставрација на фрактурирани максиларни инцизиви, посебно кај помлади пациенти се препорачува конзервативен третман со композитна реставрација на коронката.

Директните реставрации овозможуваат максимално зачувување на забната супстанција што посебно е значајно кај заби кои претходно не биле реставрирани како последица на кариес, траума или друго заболување.

Третманот се прави во истата посета и со современите композитни материјали се добива високо естетска реставрација која не се разликува од природниот заб.

